

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата

Д-ПАНТЕНОЛ

Регистрационный номер: П N011108

Торговое название препарата: Д-Пантенол

Международное непатентованное название: декспантенол

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав:

1 г мази содержит

Активное вещество - декспантенол 50,0 мг.

Вспомогательные вещества: фенолип - 4,0 мг, ланолин - 160,0 мг,

пчелиный воск белый - 50,0 мг, парафин белый мягкий - 210,8 мг,

диметикон - 5,0 мг, эмульгатор LANETTE SX - 20,0 мг,

пропиленгликоль - 20,0 мг, бутилгидроксианизол - 0,1 мг,

бутилгидрокситолуол - 0,1 мг, декаметилциклопентасилоксан -

20,0 мг, магния сульфат гептагидрат - 5,0 мг, протегин В -

295,0 мг, вода очищенная - 160,0 мг.

Описание: Однородная мазь светло-желтого цвета с характерным запахом ланолина.

Фармакотерапевтическая группа: Репарации тканей стимулятор.

Код АТХ: D03 AX03

Фармакологические свойства

Декспантенол — производное пантотеновой кислоты. В организме метаболизируется в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и участвует в процессах

ацелирования, углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, глюкокортикостероидов, порфиринов; стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие. Повышение потребности в пантотеновой кислоте наблюдается при повреждении кожного покрова или тканей, а ее недостаток можно восполнить местным применением Д-Пантенола. Оптимальная молекулярная масса, гидрофильность и низкая полярность делают возможным его проникновение во все слои кожи.

Фармакокинетика: при местном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бетаглобулином и альбумином).

Показания к применению

- сухость кожи;
- раны и ожоги различного происхождения (в т.ч. солнечные), царапины, ссадины;
- пролежни, плохо приживающиеся кожные трансплантаты, асептические послеоперационные раны, уход за кожей вокруг трахеостом, гастростом и колостом;
- дерматиты, фурункулы после вскрытия и санации, трофические язвы нижних конечностей;
- лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации;
- лечение и профилактика последствий неблагоприятного воздействия на кожу факторов внешней среды (холода, ветра, сырости);

- уход за грудными детьми:

- профилактика и лечение опрелостей у грудных детей;
- активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, пеленочном дерматите, эритеме от пеленок, царапинах и незначительном раздражении после воздействия солнца, ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

Способ применения

Наружно. Мазь наносят на поражённый участок кожи 1 или несколько раз в сутки по показаниям. Наносится тонким слоем на поражённый участок кожи, слегка втирая. Кормящим матерям смазывать мазью инфицированную поверхность соска после кормления грудью. Мазь также применяется у детей, в том числе новорожденных. Грудным детям препарат применяют после смены белья или водной процедуры.

Меры предосторожности

Лечение трофических язв и плохо заживающих кожных трансплантатов должно проводиться под наблюдением лечащего врача. Не наносить на мокнущие раны.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечены.

Побочные действия

Побочные явления развиваются исключительно редко. Возможны незначительно выраженные аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие Д-Пантенола мази с другими лекарственными средствами для наружного применения не установлено.

Применение при беременности в период лактации

Д-Пантенол мазь для наружного применения можно применять в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения. По 25 г, 50 г препарата в алюминиевой тубе, покрытой дважды защитным лаком, с запаянным отверстием и пластиковым колпачком. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения: При температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ а.о.,
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.

Держатель регистрационного удостоверения

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»
1106, Будапешт, ул. Керестури 30-38, Венгрия
Телефон: (36-1)803-5555
Факс: (36-1)803-5529

Компания, принимающая претензии потребителей:

ООО «ЭГИС-РУС»
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8,
телефон: (495) 363-39-66

ASUM920/V6

